

**PCT**

WELTOORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



<b>(51) Internationale Patentklassifikation 6 :</b> <b>C12Q 1/68</b>		<b>A2</b>	<b>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:</b> <b>WO 99/29898</b> <b>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:</b> <b>17. Juni 1999 (17.06.99)</b>
<b>(21) Internationales Aktenzeichen:</b> <b>PCT/EP98/07911</b> <b>(22) Internationales Anmeldedatum:</b> <b>4. Dezember 1998 (04.12.98)</b>		<b>(81) Bestimmungsstaaten:</b> CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
<b>(30) Prioritätsdaten:</b> 97121471.3 5. Dezember 1997 (05.12.97) EP		<b>Veröffentlicht</b> <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i>	
<b>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):</b> MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. [DE/DE]; Berlin (DE).			
<b>(72) Erfinder; und</b> <b>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US):</b> GUT, Ivo, Glynne [CH/DE]; Hackerstrasse 1, D-12161 Berlin (DE). BERLIN, Kurt [DE/DE]; Marienkäferweg 4, D-14532 Stahnsdorf (DE). LEHRACH, Hans [AT/DE]; Lützelsteinerweg 50, D-14195 Berlin (DE).			
<b>(74) Anwalt:</b> VOSSIUS & PARTNER; Siebertstrasse 4, D-81675 München (DE).			
<b>(54) Title:</b> METHOD FOR IDENTIFYING NUCLEIC ACIDS BY MEANS OF MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONISATION MASS SPECTROMETRY			
<b>(54) Bezeichnung:</b> VERFAHREN ZUR IDENTIFIKATION VON NUCLEINSÄUREN DURCH MATRIX-ASSISTIERTE LASER DESORPTIONS/IONISATIONS MASSENSPEKTROMETRIE			
<b>(57) Abstract</b> <p>The present invention relates to a method for detecting a nucleotide sequence in a nucleic acid molecule by means of predetermined probes of varying mass using matrix-assisted spectrometry. One advantage of the inventive method is that it provides for simultaneous characterization of a plurality of unknown nucleic acid molecules by a salt from various probes. The invention also relates to a kit containing the probes and/or a sample carrier, optionally with nucleic acids bonded thereto.</p>			
<b>(57) Zusammenfassung</b> <p>Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nachweis einer Nucleotidsequenz in einem Nucleinsäuremolekül mittels vorbestimmter Sonden unterschiedlicher Masse durch Matrix-assistierte Laser Desorptions/Ionisations Massenspektrometrie. Vorteilhafterweise erlaubt das erfindungsgemäße Verfahren die gleichzeitige Charakterisierung einer Vielzahl unbekannter Nucleinsäuremoleküle durch einen Satz verschiedener Sonden. Weiterhin betrifft diese Erfindung einen Kit, der die Sonden und/oder einen Probenträger, gegebenenfalls mit daran gebundenen Nucleinsäuremolekülen, enthält.</p>			

### ***LEDIGLICH ZUR INFORMATION***

**Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.**

<b>AL</b>	Albanien	<b>ES</b>	Spanien	<b>LS</b>	Lesotho	<b>SI</b>	Slowenien
<b>AM</b>	Armenien	<b>FI</b>	Finnland	<b>LT</b>	Litauen	<b>SK</b>	Slowakei
<b>AT</b>	Österreich	<b>FR</b>	Frankreich	<b>LU</b>	Luxemburg	<b>SN</b>	Senegal
<b>AU</b>	Australien	<b>GA</b>	Gabun	<b>LV</b>	Lettland	<b>SZ</b>	Swasiland
<b>AZ</b>	Aserbaidschan	<b>GB</b>	Vereinigtes Königreich	<b>MC</b>	Monaco	<b>TD</b>	Tschad
<b>BA</b>	Bosnien-Herzegowina	<b>GE</b>	Georgien	<b>MD</b>	Republik Moldau	<b>TG</b>	Togo
<b>BB</b>	Barbados	<b>GH</b>	Ghana	<b>MG</b>	Madagaskar	<b>TJ</b>	Tadschikistan
<b>BE</b>	Belgien	<b>GN</b>	Guinea	<b>MK</b>	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	<b>TM</b>	Turkmenistan
<b>BF</b>	Burkina Faso	<b>GR</b>	Griechenland	<b>ML</b>	Mali	<b>TR</b>	Türkei
<b>BG</b>	Bulgarien	<b>HU</b>	Ungarn	<b>MN</b>	Mongolei	<b>TT</b>	Trinidad und Tobago
<b>BJ</b>	Benin	<b>IE</b>	Irland	<b>MR</b>	Mauretanien	<b>UA</b>	Ukraine
<b>BR</b>	Brasilien	<b>IL</b>	Israel	<b>MW</b>	Malawi	<b>UG</b>	Uganda
<b>BY</b>	Belarus	<b>IS</b>	Island	<b>MX</b>	Mexiko	<b>US</b>	Vereinigte Staaten von Amerika
<b>CA</b>	Kanada	<b>IT</b>	Italien	<b>NE</b>	Niger	<b>UZ</b>	Usbekistan
<b>CF</b>	Zentralafrikanische Republik	<b>JP</b>	Japan	<b>NL</b>	Niederlande	<b>VN</b>	Vietnam
<b>CG</b>	Kongo	<b>KE</b>	Kenia	<b>NO</b>	Norwegen	<b>YU</b>	Jugoslawien
<b>CH</b>	Schweiz	<b>KG</b>	Kirgisistan	<b>NZ</b>	Neuseeland	<b>ZW</b>	Zimbabwe
<b>CI</b>	Côte d'Ivoire	<b>KP</b>	Demokratische Volksrepublik Korea	<b>PL</b>	Polen		
<b>CM</b>	Kamerun	<b>KR</b>	Republik Korea	<b>PT</b>	Portugal		
<b>CN</b>	China	<b>KZ</b>	Kasachstan	<b>RO</b>	Rumänien		
<b>CU</b>	Kuba	<b>LC</b>	St. Lucia	<b>RU</b>	Russische Föderation		
<b>CZ</b>	Tschechische Republik	<b>LI</b>	Liechtenstein	<b>SD</b>	Sudan		
<b>DE</b>	Deutschland	<b>LK</b>	Sri Lanka	<b>SE</b>	Schweden		
<b>DK</b>	Dänemark	<b>LR</b>	Liberia	<b>SG</b>	Singapur		
<b>EE</b>	Estland						

5

**Verfahren zur Identifikation von Nucleinsäuren  
durch Matrix-assistierte Laser Desorptions/Ionisations  
Massenspektrometrie**

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nachweis einer Nucleotidsequenz in einem Nucleinsäuremolekül mittels vorbestimmter Sonden unterschiedlicher Masse durch Matrix-assistierte Laser Desorptions/Ionisations Massenspektrometrie. Vorteilhafterweise erlaubt das erfindungsgemäße Verfahren die gleichzeitige Charakterisierung einer Vielzahl unbekannter Nucleinsäuremoleküle durch einen Satz verschiedener Sonden. 15 Weiterhin betrifft diese Erfindung einen Kit, der die Sonden und/oder einen Probenträger, gegebenenfalls mit daran gebundenen Nucleinsäuremolekülen, enthält.

Die genaue Charakterisierung von Nucleinsäuren ist sehr aufwendig und teuer. Unbekannte DNA kann charakterisiert werden, indem sie sequenziert wird. Dies ist die präziseste Art, DNA zu analysieren. Jedoch ist die Sequenzierung von DNA sehr aufwendig und nur dann notwendig, wenn die gesamte Sequenz von Interesse ist. Nur sehr kurze DNA-Ausschnitte (<1000 Nucleobasen) können in einem Arbeitsgang sequenziert werden. Wenn DNA Fragmente, die größer als diese 1000 Nucleobasen lang sind, in größerem Umfang analysiert werden sollen, ist es notwendig die DNA zu unterteilen, was die Methode verteuert.

Viele Aussagen lassen sich jedoch bereits mit geringerer Auflösung machen. 30 Die derzeit beschriebenen Verfahren leiden jedoch darunter, daß unter Umständen Radioaktivität verwendet werden muß, und nur eine einzige Sonde in einer Analyse verwendet werden kann. Ein solches Verfahren aus dem Stand der Technik beinhaltet zum Beispiel, partielle Information über einen Array von verschiedenen Ziel-DNAs zu suchen. Ein Array mit vielen tausend Ziel-DNAs kann auf einer Festphase immobilisiert und anschließend können alle Ziel-DNAs gemeinsam auf das Vorhandensein einer Sequenz mittels einer Sonde (Nucleinsäure mit komplementärer Sequenz) untersucht werden.<sup>1,2</sup> Eine Übereinstimmung in der Ziel-DNA mit der Sonde kann durch

eine Hybridisation der beiden Nucleinsäuren nachgewiesen werden. Sonden können beliebige Nucleinsäuresequenzen unterschiedlicher Länge sein. Es existieren verschiedene Verfahren für die Auswahl von optimalen Bibliotheken von Sondensequenzen, welche minimal miteinander überlappen.<sup>3,4</sup> Sondensequenzen können auch gezielt zusammengestellt werden, um bestimmte Ziel-DNA Sequenzen aufzufinden. Oligofingerprinting ist ein Ansatz, bei welchem diese Technologie zum Einsatz kommt. Eine Bibliothek von Ziel-DNAs wird mit kurzen Nucleinsäuresonden abgetastet. Meist sind hier die Sonden nur 8-12 Basen lang. Es wird jeweils eine Sonde auf einmal an eine auf einer Nylonmembran immobilisierte Ziel-DNA-Bibliothek hybridisiert. Die Sonde ist radioaktiv markiert und die Hybridisierung wird anhand der Lokalisierung der Radioaktivität beurteilt. Für die Abtastung eines immobilisierten DNA-Arrays sind auch bereits fluoreszent markierte Sonden verwendet worden.<sup>5</sup> Ein ähnliches Verfahren wird verwendet, um Sequenzierung von DNA zu multiplexen.<sup>6,7</sup> Verschiedene Vektorsysteme werden zur Klonierung von Zielsequenzen eingesetzt. Jeweils ein Klon von jedem Klonierungsvektor wird gepoolt, die Sequenzierungsreaktion durchgeführt, die Fragmente auf einem Gel aufgetrennt und das Gel auf eine Nylonmembran geblottet. An die immobilisierte DNA werden anschließend die unterschiedlichen Sequenzen des Klonierungssystems hybridisiert, so daß man die zum jeweiligen Klonierungssystem gehörende Sequenz erhält. Hier kann die Abtastung des Klonierungssystems auch mittels einer massenspektrometrisch detektierbaren Sonde erfolgen.<sup>8</sup>

Als Sonden kommen jegliche Moleküle in Frage, die sequenzspezifisch mit einer Ziel-DNA wechselwirken können. Am gängigsten sind Oligodeoxyribonucleotide. Für diesen Zweck bietet sich jedoch jede Modifikation von Nucleinsäuren an, z.B. Peptide Nucleic Acids (PNA),<sup>9,10</sup> Phosphorothioatoligonucleotide oder Methylphosphonatoligonucleotide. Die Spezifität einer Sonde ist sehr wesentlich. Phosphorothioatoligonucleotide sind nicht besonders bevorzugt, da ihre Struktur durch die Schwefelatome verändert wird, was einen negativen Einfluß auf die Hybridisierungseigenschaften hat. Dies kann daher stammen, daß Phosphorothioatoligonucleotide normalerweise nicht diastereomerenrein synthetisiert werden. Bei Methylphosphonatoligonucleotiden bestand in der Vergangenheit ein ähnliches Reinheitsproblem, jedoch werden diese Oligonucleotide vermehrt diastereomerenrein synthetisiert. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Methylphosphonatoligonucleoti-

den und Phosphorothioatoligonucleotiden ist das bei ersteren ungeladene Rückgrat, welches zu einer verminderten Abhängigkeit der Hybridisation von Puffersalzen und insgesamt durch die geringere Abstoßung zu höherer Affinität führt. Peptide Nucleic Acids haben ebenfalls ein ungeladenes Rückgrat, 5 welches gleichzeitig chemisch sehr stark von der gängigen Zucker-Phosphat Struktur des Rückgrats in Nucleinsäuren abweicht. Das Rückgrat einer PNA weist eine Amidsequenz anstelle des Zucker-Phosphat Rückgrats gewöhnlicher DNA auf. PNA hybridisiert sehr gut mit DNA komplementärer Sequenz. Die Schmelztemperatur eines PNA/DNA-Hybrids ist höher als die des entsprechenden DNA/DNA-Hybrids und wiederum ist die Abhängigkeit der Hybridisierung von Puffersalzen relativ gering.

Matrix-assistierte Laser Desorptions/Ionisations Massenspektrometrie (MALDI) ist eine neue, sehr leistungsfähige Methode für die Analyse von 15 Biomolekülen.<sup>11</sup> Ein Analytmolekül wird in eine lichtabsorbierende Matrix eingebettet. Durch einen kurzen Laserpuls wird die Matrix verdampft und der Analyt so unfragmentiert in die Gasphase befördert. Durch Stöße mit Matrixmolekülen wird die Ionisation des Analyts erreicht. Eine angelegte Spannung beschleunigt die Ionen in ein feldfreies Flugrohr. Auf Grund ihrer verschiedenen 20 Massen werden Ionen unterschiedlich stark beschleunigt. Kleinere Ionen erreichen den Detektor früher als größere. Die Flugzeit wird in die Masse der Ionen umgerechnet. Technische Neuerungen der Hardware haben die Methode signifikant verbessert. Erwähnenswert ist delayed extraction (DE).<sup>12</sup> Für DE wird die Beschleunigungsspannung mit einer Verzögerung zum Laserpuls 25 eingeschaltet und dadurch eine verbesserte Auflösung der Signale erreicht, weil die Zahl der Stöße verringert wird. MALDI eignet sich ausgezeichnet zur Analyse von Peptiden und Proteinen. Die Analyse von Nucleinsäuren ist schwieriger.<sup>13</sup> Für Nucleinsäuren ist die Empfindlichkeit etwa 100mal schlechter als für Peptide und nimmt mit zunehmender Fragmentgröße überproportional ab. Der Grund dafür liegt darin, daß für die Ionisation von Peptiden und Proteinen lediglich ein einziges Proton eingefangen werden muß. Für Nucleinsäuren, die ein vielfach negativ geladenes Rückgrat haben, ist 30 der Ionisationsprozeß durch die Matrix wesentlich ineffizienter. Für MALDI

spielt die Wahl der Matrix eine eminent wichtige Rolle. Für die Desorption von Peptiden sind einige sehr leistungsfähige Matrices gefunden worden, die eine sehr feine Kristallisation ergeben. Für DNA sind zwar mittlerweile einige ansprechende Matrices gefunden worden, jedoch wurde dadurch der Empfindlichkeitsunterschied nicht verringert. Der Empfindlichkeitsunterschied kann verringert werden, indem die DNA chemisch so modifiziert wird, daß sie einem Peptid ähnlicher wird. Phosphorothioatnucleinsäuren, bei denen die gewöhnlichen Phosphate des Rückgrats durch Thiophosphate substituiert sind, lassen sich durch einfache Alkylierungsschemie in eine ladungsneutrale DNA umwandeln.<sup>14</sup> Die Kopplung eines "charge tags" an diese modifizierte DNA resultiert in der Steigerung der Empfindlichkeit in den gleichen Bereich wie er für Peptide gefunden wird.<sup>15,16</sup> Durch diese Modifikationen hat sich auch die Möglichkeit eröffnet, ähnliche Matrices wie sie für die Desorption von Peptiden verwendet werden zu benutzen. Ein weiterer Vorteil von charge tagging ist die erhöhte Stabilität der Analyse gegen Verunreinigungen, die den Nachweis unmodifizierter Substrate stark erschweren. PNAs und Methylphosphonatoligonucleotide sind mit MALDI untersucht worden und lassen sich so analysieren.<sup>17,18,19</sup>

Kombinatorische Synthesen,<sup>20</sup> d.h. die Herstellung von Substanzbibliotheken ausgehend von einem Gemisch von Vorstufen, werden sowohl auf fester als auch in flüssiger Phase durchgeführt. Vor allem die kombinatorische Festphasensynthese hat sich frühzeitig etabliert, da in diesem Fall die Abtrennung von Nebenprodukten besonders einfach ist. Nur die an den Träger (Support) gebundenen Zielverbindungen werden in einem Waschschritt zurückbehalten und am Ende der Synthese durch das gezielte Spalten eines Linkers isoliert. Diese Technik erlaubt auf einfachem Wege die gleichzeitige Synthese einer Vielzahl verschiedener Verbindungen an einer Festphase und somit den Erhalt von chemisch "reinen" Substanzbibliotheken.<sup>21,22,23</sup> Daher sind die Verbindungsklassen, die auch in nicht kombinatorischen, konventionellen Synthesen auf einer Festphase synthetisiert werden, der kombinatorischen Chemie besonders leicht zugänglich und werden demzufolge auch

breit verwendet. Dies trifft vor allem auf Peptid-, Nucleinsäure- und PNA-Bibliotheken zu.

Die Synthese von Peptiden erfolgt durch Binden der ersten N-geschützten Aminosäure (z.B. Boc) an den Support, nachfolgende Entschützung und Reaktion der zweiten Aminosäure mit der freigewordenen NH<sub>2</sub>-Gruppe der ersten. Nicht reagierte Aminofunktionen werden in einem weiteren "Capping" Schritt einer Weiterreaktion im nächsten Syntheszyklus entzogen. Die Schutzgruppe an der Aminofunktion der zweiten Aminosäure wird entfernt und der nächste Baustein kann gekoppelt werden. Zur Synthese von Peptidbibliotheken wird ein Gemisch von Aminosäuren in einem oder mehreren Schritten verwendet. Die Synthese von PNA und PNA-Bibliotheken erfolgt sinngemäß.

Nucleinsäure-Bibliotheken werden meist durch Festphasensynthese mit Gemischen verschiedener Phosphoramidit-Nucleoside erhalten. Dies kann auf kommerziell erhältlichen DNA-Synthesizern ohne Veränderungen in den Syntheseprotokollen durchgeführt werden. Darüber hinaus sind verschiedene Arbeiten zur kombinatorischen Synthese von PNA Bibliotheken publiziert worden.<sup>24,25</sup> Diese Arbeiten behandeln den Aufbau von kombinatorischen Sequenzen, d.h. die Synthese von PNAs in denen einzelne, spezifische Basen in der Sequenz durch degenerierte Basen ersetzt werden und dadurch zufällige Sequenzvarianz erreicht wird. Auch die Verwendung massenspektrometrischer Methoden für die Analyse kombinatorischer Bibliotheken ist mehrfach beschrieben worden.<sup>26,27,28,29</sup>

Es existieren verschiedene Verfahren, um DNA zu immobilisieren. Das bekannteste Verfahren ist die Festbindung einer DNA, welche mit Biotin funktionalisiert ist, an eine Streptavidin-beschichtete Oberfläche.<sup>30</sup> Die Bindungsstärke dieses Systems entspricht einer kovalenten chemischen Bindung, ohne eine zu sein. Um eine Ziel-DNA kovalent an eine chemisch vorbereitete Oberfläche binden zu können, bedarf es einer entsprechenden Funktionalität der Ziel-DNA. DNA selbst besitzt keine Funktionalisierung, die dazu geeignet

ist. Es gibt verschiedene Varianten, in eine Ziel-DNA eine geeignete Funktionalisierung einzuführen: Zwei leicht zu handhabende Funktionalisierungen sind primäre, aliphatische Amine und Thiole. Solche Amine werden quantitativ mit N-Hydroxy-succinimidestern umgesetzt. Thiole reagieren unter geeigneten Bedingungen quantitativ mit Alkyliodiden. Eine Schwierigkeit besteht im Einführen einer solchen Funktionalisierung in eine DNA. Die einfachste Variante ist die Einführung durch einen Primer einer PCR. Gezeigte Varianten benutzen 5'-modifizierte Primer (NH<sub>2</sub> und SH) und einen bifunktionalen Linker.<sup>31,32,33</sup>

10

Bei der Immobilisierung auf einer Oberfläche ist vor allem ihre Beschaffenheit von wesentlicher Bedeutung. Bis jetzt beschriebene Systeme sind hauptsächlich aus Silizium oder Metall (magnetic beads). Eine weitere Methode zur Bindung einer Ziel-DNA basiert darauf, eine kurze Erkennungssequenz (z.B. 15 20 Basen) in der Ziel-DNA zur Hybridisierung an ein oberflächenimmobilisiertes Oligonucleotid zu verwenden.<sup>34</sup> Es sind auch enzymatische Varianten zur Einführung von chemisch aktivierten Positionen in eine Ziel-DNA beschrieben worden.<sup>35</sup> Hier wird an einer Ziel-DNA enzymatisch eine 5'-NH<sub>2</sub>-Funktionalisierung durchgeführt.

20

Wie vorstehend beschrieben, sind im Stand der Technik eine Reihe von Verfahren bekannt, die vor allem auf eine genaue Analyse von Nucleinsäuren ausgerichtet sind. Diese Verfahren sind in der Regel entweder sehr arbeitsaufwendig und/oder kostenintensiv.

25

Das der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende technische Problem war somit, ein schnelles und kosteneffizientes Verfahren zur Identifikation von Ziel-Nucleinsäuren bereitzustellen.

30 Dieses technische Problem wird durch die Bereitstellung der in den Patentansprüchen gekennzeichneten Ausführungsformen gelöst.

Somit betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Nachweis einer Nucleotidsequenz in einem Nucleinsäuremolekül, das die folgenden Schritte umfaßt:

- (a) Hybridisierung von Nucleinsäuremolekülen mit einem Satz von Sonden unterschiedlicher Nucleobasensequenzen, wobei jede Sonde eine von allen anderen Sonden verschiedene Masse aufweist;
- (b) Abtrennung der nicht hybridisierten Sonden;
- (c) Kontaktierung der hybridisierten Sonden mit einer Matrix, welche die Desorption der Sonden durch einen Laserstrahl unterstützt;
- (d) Analyse der hybridisierten und von der Matrix umgebenen Sonden auf einem aus elektrisch leitfähigem Material bestehenden Probenträger in einem Massenspektrometer; und
- (e) Bestimmung der Nucleinsäuremoleküle, welche die Sequenz aufweisen, wobei die Positionen der Sonden auf dem Probenträger eine Zuordnung zu dem damit hybridisierenden Nucleinsäuremolekül erlaubt.

Das erfindungsgemäße Verfahren kombiniert in vorteilhafter Weise Verfahren, Arrays von Ziel-Nucleinsäuren zu analysieren (Oligofingerprinting), sowie die massenspektrometrische Analyse von Nucleinsäuren und modifizierten Nucleinsäuren. Dabei wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Sonden eingesetzt, die den Nachweis von einer oder mehreren Nucleotidsequenz(en) in einem Nucleinsäuremolekül erlauben. Eine Kombination dieser beiden Methoden konnte bisher nicht durchgeführt werden, weil die Massenunterscheidbarkeit der Sonden keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Sequenz zuließ und die Empfindlichkeit der massenspektrometrischen Analyse von Nucleinsäuren nicht an die Probenmengen eines Oligofingerprinting-Experimentes angepaßt war. Voraussetzung dafür, daß eine bestimmte Sequenz nachgewiesen werden kann, ist, daß im Verfahren Sonden eingesetzt werden, die eine Hybridisierung mit der Zielsequenz erlauben. Die Bestimmung der Nucleinsäuremoleküle erfolgt dabei über den Nachweis der Hybridisierung mit einer der Sonden.

Dem Fachmann ist klar, daß eine gesuchte Nucleotidsequenz mit Hybridisierungsverfahren nicht immer absolut ermittelt werden kann, da auch unter stringenten Hybridisierungsbedingungen trotz sogenannter "Matches" unter Umständen eine Hybridisierung einer Sonde stattfinden kann (z.B. ab 5 einer bestimmten Mindestlänge einer Sonde oder bei (einer) Positionierung(en) des/der Matches, die bei der Hybridisierung tolerierbar ist/sind). Bei einer vorgegebenen Nucleotidsequenz einer Sonde kann eine Komplementärsequenz im Nucleinsäuremolekül somit in einem Teil der Ausführungsformen nur mit einer gewissen Näherung ermittelt werden, da neben 10 exakten Komplementärsequenzen unter Umständen auch solche ermittelt werden können, die in ihrer Sequenz nicht exakt komplementär sind. Insofern umfaßt die Nucleotidsequenz auch homologe Nucleotidsequenzen, die vorzugsweise einen Homologiegrad von mehr als 90 %, besonders bevorzugt von mehr als 95 % aufweisen. Alle diese vorstehenden Ausführungsformen 15 sind von der vorliegenden Erfindung umfaßt.

Je nach Wahl der Hybridisierungsbedingungen kann das erfindungsgemäße Verfahren verwendet werden, um entweder spezifische Nucleotidsequenzen oder Gruppen von Nucleotidsequenzen nachzuweisen, die sich durch eine 20 ähnliche Sequenz auszeichnen. Werden z.B. stringenten Hybridisierungsbedingungen gewählt, so sind die verwendeten Sonden nur in der Lage, an die Nucleotidsequenzen zu hybridisieren, die exakt komplementär zu ihren Nucleobasensequenzen sind. Werden hingegen nicht stringenten Hybridisierungsbedingungen gewählt, so kann man mit den eingesetzten Sonden alle 25 Nucleotidsequenzen nachweisen, die von den Nucleobasensequenzen der Sonden derart abweichen, daß sie unter den gewählten Bedingungen eine Hybridisierung noch erlauben. Auf diese Art und Weise kann das erfindungsgemäße Verfahren also auch verwendet werden, um Homologe, Varianten oder Allele einer bestimmten Sequenz nachzuweisen. Dem Fachmann ist bekannt, was unter stringenten bzw. nicht stringenten Hybridisierungsbedingungen zu verstehen ist; vgl. z. B. Sambrook et al., "Molecular Cloning, A Laboratory Manual" CSH Press, Cold Spring Harbor, 2nd ed. 1989, Hames und Higgins (Hrsg.) "Nucleic Acid Hybridization, A Practical Approach", IRL Press, Oxford 1985. Stringente Hybridisierungsbedingungen sind, zum Beispiel, Hybridisierung in 6 x SSC, 5 x Denhardt's Reagens, 0,5 % SDS und 30 35

100 µg/ml denaturierter DNA bei 65 °C und Waschen in 0,1 x SSC, 0,1 % SDS bei 65 °C. Nicht-stringente Hybridisierungsbedingungen unterscheiden sich von den obengenannten Bedingungen insofern, als beispielsweise die Hybridisierung und/oder das Waschen bei einer niedrigeren Temperatur 5 durchgeführt werden, z.B. bei 50 °C oder 55 °C und/oder die Menge von SSC auf z.B. 1 x oder 2 x SSC angehoben wird.

Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt auch den Nachweis mehrerer unterschiedlicher Sequenzen in einer Ziel-DNA, wobei die unterschiedlichen 10 Sequenzen komplementär zu verschiedenen Sonden sind. Günstigstenfalls, z. B. bei Verwendung von Sonden mit überlappenden Sequenzen, lässt sich so die gesamte Nucleotidsequenz einer Ziel-Nucleinsäure nachweisen oder aufklären.

15 Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren lässt sich zunächst bestimmen, ob auf dem Probenträger eine Probe aufgetragen war, die eine mit einer Sonde unter den gewählten Bedingungen hybridisierbare Sequenz aufweist. Sofern dies der Fall ist, kann die Proben-Nucleinsäure weiter analysiert und charakterisiert werden. Da für das erfindungsgemäße Verfahren üblicherweise 20 nur ein Bruchteil einer Probe für die erfindungsgemäße Analyse eingesetzt werden muß, kann die nicht eingesetzte Nucleinsäure mit Standardverfahren, z. B. Sequenzierungsverfahren, weiter untersucht werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch, parallel oder sukzessive, 25 mehrmals durchgeführt werden, wobei die Hybridisierungsbedingungen variiert werden. So kann man beispielsweise in einem Ziel-DNA-Array zunächst feststellen, wie viele und welche Ziel-DNAs einen bestimmten Homologiegrad aufweisen, bevor nach spezifischen Sequenzen gesucht wird.

30 Die Zuordnung der an einer bestimmten Position auf dem Probenträger hybridisierten Sonde zur immobilisierten Probe erfolgt vorzugsweise mittels eines Datenverarbeitungssystems, das das jeweilige aufgenommene Spektrum auf einer Position des Probenträgers einer auf derselben Position angebrachten Ziel-DNA zuordnet. Vorzugsweise sind die Ziel-Nucleinsäuren auf 35 der Oberfläche bzw. auf dem Proteinträger in einer bestimmten Ordnung angeordnet.

Wie vorstehend erwähnt, besteht der Probenträger aus einem elektrisch leitfähigem Material. Dies schließt auch die Oberfläche des Probenträgers ein, auf dem die hybridisierten und von der Matrix umgebenen Sonden aufsitzen. Die Oberfläche kann sich dabei stofflich vom Probenträger unterscheiden.

5

Die Oberfläche, an der die Sonden für die Massenspektrometrie direkt oder indirekt immobilisiert sein müssen, muß so beschaffen sein, daß sie als Probenträger für ein Massenspektrometer fungieren kann (Figur 2). Dies bedeutet, daß sie aus einem elektrisch leitfähigen Material bestehen muß, da, um 10 eine stabile Beschleunigung der ionisierten Sondenmoleküle zu erreichen, eine definierte Spannung angelegt werden muß. Eine nichtleitende Oberfläche würde zu einer elektrostatischen Aufladung führen, wodurch wegen der Spannungsabweichung eine Massenverschiebung beobachtet und eine Massenzuordnung unmöglich gemacht würde.

15

Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind nachstehend beschrieben und können auch den Beispielen entnommen werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens 20 werden die Nucleinsäuremoleküle vor oder nach Schritt (a) auf die Oberfläche eines Trägers übertragen. Als Träger eignen sich dazu z.B. "magnetic beads", Kunststoffbeads oder Glasbeads, die beispielsweise mit Streptavidin oder mit Aminogruppen, SH-Gruppen oder Epoxygruppen funktionalisiert sind.

25

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei der Oberfläche des Trägers um die Oberfläche des aus elektrisch leitfähigem Material bestehenden Probenträgers. Diese Ausführungsform erlaubt eine relativ unkomplizierte Durchführung des Verfahrens, da die Nucleinsäuremoleküle nach erfolgter Hybridisierung nicht mehr auf den Probenträger transferiert werden müssen.

In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird vor Schritt (c) der Träger mit den an seiner Oberfläche aufgebrachten Nucleinsäuremolekülen, die die hybridisierten Sonden tragen, auf den aus elektrisch leitfähigem Material bestehenden Probenträger 5 aufgebracht. Die Anheftung kann z.B. durch die Matrix selbst oder durch Zugegabe von Nitrozellulose zur Matrix bewirkt werden.

In einer ebenfalls besonders bevorzugten Ausführungsform werden die hybridisierten Sonden vor dem, nach dem oder durch den Kontakt mit der Matrix 10 in Schritt (c) von den immobilisierten Nucleinsäuremolekülen abgelöst und auf den aus leitfähigem Material bestehenden Probenträger aufgebracht. In dieser Ausführungsform werden die Komplexe aus hybridisierten Nucleinsäuremolekülen und Sonden denaturiert, und nur die Sonden auf den Probenträger 15 aufgebracht. Eine Denaturierung kann durch bekannte Methoden wie z.B. alkalische oder Hitze-Denaturierung bewirkt werden oder auch durch die saure Matrixlösung selbst.

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform besitzt der Probenträger entweder eine metallische, mit Glas beschichtete oder chemisch modifizierte 20 Oberfläche, die ein Festbinden der Ziel-DNA erlaubt.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt die Immobilisierung der Nucleinsäuremoleküle an der Probenträgeroberfläche über eine NH<sub>2</sub>-, Epoxy- oder SH-Funktion, mittels der 25 Beschichtung der Probenträgeroberfläche mit einem Silikat oder Silan, über eine Protein-Substrat-, Protein-Protein- oder eine Protein-Nucleinsäure-Interaktion, oder über eine Wechselwirkung zweier hydrophober Komponenten.

30 Wird der Probenträger z.B. mit Gold beschichtet, kann eine Kopplung der Ziel-DNA durch während der molekularbiologischen Aufbereitung der Ziel-DNA eingeführte SH- oder NH<sub>2</sub>-Funktionen erfolgen. Auch die umgekehrte Möglichkeit, entsprechend modifizierte DNA an funktionalisierte Goldpartikel

zu binden, besteht. Die Firma Nanopropes Inc., Stony Brook, NY, bietet beispielsweise mit Streptavidin oder mit Aminofunktionen verknüpfte Gold-Nanopartikel kommerziell an. Wie bereits erwähnt, besteht eine weitere Möglichkeit darin, die metallische Probenträgeroberfläche mit Glas zu beschichten. Durch eine Aminofunktionalisierung kann anschließend eine Kopplung der Ziel-DNA, welche über eine SH-Funktionalisierung an einen bifunktionalen Linker (z.B. SIAB, Pierce Chemical, Rockford, IL, USA) gebunden ist, an die Glasoberfläche erreicht werden. Eine weitere Variante ist die unmittelbare Beschichtung der Metallocberfläche mit Trimethoxy-3-aminopropylsilan. An die Aminofunktion kann anschließend eine Ziel-DNA, wie oben über einen bifunktionalen Linker, gekoppelt werden.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist dabei die Protein-Substrat-Interaktion eine Biotin-Streptavidin- oder eine Antikörper-Antigen-Bindung. MALDI-Probenträger sind üblicherweise aus Metall (z. B. Eisen), an das sich ohne weitere Modifikation weder Proteine noch DNA-Moleküle immobilisieren lassen. Eine Möglichkeit der Immobilisierung ist, die Eisenoberfläche mit Gold zu beschichten, da sich z. B. SH-Funktionen daran binden lassen. Für die Kopplung bieten sich dann bifunktionale Linker an, die eine SH-Funktion und eine weitere Funktion besitzen, die an die Funktionalisierung der Ziel-DNA angepaßt ist. Ist z. B. die Ziel-DNA biotinfunktionalisiert, sollte der Linker mit Streptavidin gekoppelt werden können. Ist die Ziel-DNA NH<sub>2</sub>-funktionalisiert, dann kann der Linker mit einer N-hydroxysuccinimidylester-Funktion versehen sein.

25

In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist die Protein-Nucleinsäure-Interaktion eine Bindung der Nucleinsäure an Gene32, ein Protein, welches sequenzunspezifisch einzelsträngige DNA bindet.

30 In einer ebenfalls bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßigen Verfahrens sind die verwendeten Sonden Nucleinsäuren, die mit einem Massen-Tag versehen sind. Gemäß dieser Ausführungsform können die Sonden auch mit mehreren Tags versehen sein, die an unterschiedlichen Positionen,

z. B. am 5' und 3' Ende lokalisiert sind. Durch Kombination der Anzahl und Lokalisierung von Massen-Tags, gegebenenfalls in Kombination mit Ladungs-Tags, lässt sich die Versalität und Empfindlichkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens deutlich erhöhen.

5

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind die Massen-Tags zu gleich Ladungs-Tags, während in einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform die Nucleinsäuren zusätzlich mit einem Ladungs-Tag ("Charge-Tag") versehen sind.

10

"Charge tagging" kann entsprechend der Methode von Gut et al. durchgeführt werden.<sup>15,16</sup> Ein aminofunktionalisiertes Substrat (1 mM) wird in Trimethylamin/CO<sub>2</sub>-Puffer (pH = 8.5, 200 mM) auf Eis bei 0 °C mit 1%  $\omega$ -Trimethylammoniumhexansäure-N-hydroxy-succinimidylester (CT) versetzt.

15 Nach 30 Minuten werden der flüchtige Puffer und das Lösungsmittel im Vakuum abgezogen. Das aminofunktionalisierte Substrat kann z.B. eine kombinatorisch hergestellte Bibliothek von massenverschiedenen Sonden sein. Durch die Variation der Länge und Funktionalisierung des CT lassen sich die Massen der Substratbibliothek um einen definierten Betrag verschieben (Fig. 3).

20 Da in der kombinatorischen Synthese z.B. eine Sondenbibliothek von 64 massenverschiedenen Sonden (Fig. 4), die sich über einen Massenbereich von 200 Da erstrecken, hergestellt werden, erhöhen die Massen/charge tags jeweils in Einheiten von 200 Da die Masse. d.h. der erste kombinatorische Syntheseansatz wird mit dem kleinstmöglichen charge tag hergestellt, der 25 zweite mit einem Massen/charge (Ladungs-) tag, das 200 Da schwerer ist, der dritte mit einem Massen/charge tag das weitere 200 Da schwerer ist usw.

Theoretisch kann der Bereich beliebig ausgeweitet werden, solange das angewendete Massenspektrometer in der Lage ist, den Unterschied zwischen zwei massenbenachbarten Sonden aufzulösen und solange die Synthese

30 präparativ praktikabel erscheint. Für Sonden mit 10 Nucleobasen bekommt man ein Grundmasse im Bereich von 2600-2800 Da. Mit derzeit käuflichen Massenspektometern ist der benützbare Massenbereich mit ausreichender Massengenauigkeit unter 4000 Da. Dadurch können sieben Ensembles von

64 Sonden verwendet werden (insgesamt 448 Sonden). Ergebnisse, die mit dieser Ausführungsform erhalten worden sind, sind in den Figuren 5 und 6 dargestellt.

5 Die Synthese von Peptiden auf einem automatisierten Synthesizer verläuft vom C-terminalen Ende zum N-terminalen Ende, die Synthese von Nucleinsäuren vom 3'- zum 5'-Ende. Es besteht die Möglichkeit an einem oder an beiden Enden eine primäre Aminofunktion anzubringen, um dann durch eine oder zwei Funktionalisierungen die Massenverschiebung zu erreichen. Alternativ kann die Massenverschiebung einer Bibliothek von kombinatorisch hergestellten Sonden auch erreicht werden, indem vorgängig zum Einbau der kombinatorischen Bausteine einige Bausteine von definierter Masse (z.B. Aminosäuren in eine kombinatorische Synthese von PNAs) angebracht werden. Die erste kombinatorische Synthese beginnt unmittelbar am Support.

10 15 Für die zweite kombinatorische Synthese werden zuerst z.B. zwei Valine gekoppelt. Valin hat eine Masse von 99 Da. Durch zwei Valine erreicht man eine Massenverschiebung der zweiten kombinatorischen Synthese von der ersten um 198 Da. Bei der dritten kombinatorischen Synthese werden zuerst vier Valine gekoppelt, wodurch die Masse dieses Ensembles 396 Da höher ist usw. Ein allfällig nötiges charge tag kann immer noch nachträglich mit der oben beschriebenen Methode am N-terminalen Ende angebracht werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die charge tags zuerst an die Festphase zu koppeln und anschließend mit der kombinatorischen Synthese fortzufahren.

20 25 Eine weitere Variante besteht darin, gleichzeitig mehrere fixe Ladungen der gleichen Polarität anzubringen. Dadurch kann der Detektionsbereich vermindert werden. In einem Massenspektrometer wird ein Molekül mit zwei Ladungen bei der entsprechend halben Masse beobachtet. Dies kann einen Vorteil bringen, wenn die Auflösung des Massenspektrometers zu höheren Massen hin stark abnimmt. Oben ist beschrieben, wie man positive fixe Ladungen an einer Sonde festbringen kann. Negative fixe Ladungen können ähnliche

Vorteile bringen. Positive und negative fixe Ladungen lassen sich mit ähnlichen Methoden herstellen.

Für die Lokalisierung, Anzahl und Kombinatorik der Ladungs-Tags gelten die 5 im Zusammenhang mit den Massen-Tags gemachten Ausführungen entsprechend. So kann mittels charge tagging am 5'- oder 3'- Terminus der Bibliothek von Nucleinsäure-Sonden die Empfindlichkeit der Analyse verbessert werden. Dies gilt insbesondere, wenn durch die Einführung von Alkylphosphonatgruppen an den nicht randomisierten Positionen (vgl. unten) ansonsten 10 Ladungsneutralität hergestellt wird. Durch das mit dem Charge Tagging zwangsläufig verbundene Massen Tagging wird zusätzlich die Analyse der Fragmente aus der Spaltung an den Phosphorothioatgruppen erleichtert. Phosphoroselenoate können ebenfalls eingesetzt werden, um eine bevorzugte Spaltung an bestimmten Positionen zu erhalten.

15

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sind die Sonden modifizierte Nucleinsäuremoleküle.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei diesen 20 modifizierten Nucleinsäuremolekülen um PNAs, alkylierte Phosphorothioat-nucleinsäuren oder Alkylphosphonatnucleinsäuren.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden die Sonden des erfindungsgemäßen Verfahrens durch kombinatorische Festphasensynthese 25 hergestellt. Das erfolgt über z.B. über die übliche Boc-Festphasensynthese, die auch zur Synthese von PNA-Reinsubstanzen kommerziell angewandt wird. Dabei werden in ausgewählten Positionen innerhalb einer sonst festgelegten Sequenz der Sonden-PNA alle vier, oder mehr als eine der Basen Adenin, Guanin, Cytosin oder Thymin, nebeneinander eingebaut. Dies erfolgt 30 durch den Einsatz nicht nur eines, sondern mehrerer Synthesebausteine in einem Schritt in der Festphasensynthese. Durch Variationen in mehreren solchen Positionen entsteht eine PNA-Bibliothek. Im Anschluß an die PNA-Synthese kann ein charge tagging an der freien terminalen Aminofunktion

durchgeführt werden. Dies verbessert den dynamischen Bereich der PNA-Analyse mittels MALDI.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform werden deshalb bei der

5 Festphasensynthese die unterschiedlichen Basenbausteine derart markiert, daß ihre Massen bzw. die Massen der aus ihnen synthetisierten Sonden im Massenspektrometer unterscheidbar sind. Diese Markierung wird so bewerkstelligt, daß zur Base korrespondierend am Rückrat eine unterschiedliche Massenmodifikation eingeführt wird (Figur 7). Auf diese Art und Weise erhalten 10 die synthetisierten Sonden Massen, die spezifisch für ihre Sequenzen sind. Binden nun Sonden an eine auf dem MALDI-Target immobilisierte Ziel-DNA, so erlauben die im MALDI-Experiment zugänglichen Masseninformationen eindeutige Rückschlüsse auf die Sequenzen der jeweils hybridisierten PNA-Sonden.

15 In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Basenbausteine mit einer Methyl-, Ethyl-, Propyl-, eine verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, eine halogensubstituierte verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, Alkoxyalkyl-, Alkylaryl-, Arylalkyl-, Alkoxyaryl- oder Aryloxyalkyl-Gruppe oder mit einer von deren deuterierten oder sonstigen isotopen Varianten markiert. Da bei Verwendung nicht massenmodifizierter Bausteine die Molekülmasse allenfalls Rückschlüsse auf die Basenzusammensetzung, nicht aber auf die Sequenz erlaubt, werden massengelabelte Bausteine (d.h. am Rückgrat substituierte PNA Monomere) verwendet, die für jede randomisierte Position innerhalb der PNA-Bibliothek charakteristisch sind. Da auf diese Weise der Synthesebaustein einer bestimmten Base in der Position x eine andere Masse hat als in der Position y, werden auch unterschiedliche Sequenzen bei gleicher Bruttozusammensetzung der Basen über die Molekülmasse unterscheidbar. Die jeweiligen Substituenten werden durch numerische Rechnung so ausgewählt, daß jeder denkbaren Sequenz aufgrund der beschriebenen Art der Bibliothekssynthese eine festgelegte Masse eineindeutig entspricht.

Die Synthese von Nucleinsäure-Sonden-Bibliotheken erfolgt am Synthesizer, indem an den zu randomisierenden Positionen Gemische verschiedener Nucleosidderivate (in der Regel Phosphoramidite) eingesetzt werden. Die sich daraus ergebenden Bibliotheken können ebenfalls als Sonden im oben beschriebenen Verfahren eingesetzt werden. Zur Unterscheidung der verschiedenen Sequenzen innerhalb der Bibliothek soll ein gezielter Bindungsbruch z.B. an festgelegten Phosphodiesterbindungen durchgeführt werden, die sich auf einer festgelegten Seite der randomisierten Positionen befinden.

10 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sind somit die Sonden mit mindestens einer Modifikation in einer definierten Position von randomisierten Nucleotiden entfernt versehen, die eine Spaltung der Sonde erlauben.

15 In einer besonders bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dieser Modifikation um die Einführung einer Phosphorothioatgruppe und/oder einer RNA-Base und/oder einer Phosphotriesterbindung.

20 Enthält eine Sonde drei randomisierte Positionen, so sind mindestens zwei solcher Bindungsbrüche erforderlich (Figur 10). Es ergeben sich dann drei Fragmente, die jeweils eine randomisierte Position enthalten und damit aufgrund der sonst bekannten Zusammensetzung über ihre Masse unmittelbar auf die variable Base schließen lassen. Die Spaltung an den beschriebenen Bindungen kann unvollständig erfolgen. Dies erlaubt die Einbeziehung größerer Fragmente, um die Sequenzinformation abzusichern oder bei Mehrdeutigkeiten zu konkretisieren. Der spezifische Bindungsbruch an den randomisierten Positionen wird durchgeführt, indem bereits bei der Synthese der Bibliothek dort Phosphorothioatgruppen eingeführt werden. Diese können mit Hydroxyalkylhalogeniden zuerst hydroxyalkyliert und dann unter basischen Bedingungen selektiv gespalten werden. Alternativ können Proben so aufgebaut werden, daß neben einer randomisierten Position Uracil eingebaut wird. Mittels Uracil-DNA Glycosylase und nachfolgender alkalischer Behandlung kann das Rückgrat dann an dieser Stelle gebrochen werden.

Die Matrix wird üblicherweise so gewählt, daß sie bei der gewählten Laserwellenlänge einen hohen Extinktionskoeffizienten sowie eine gute Unterstützung der Ladungsbildung aufweist. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht die Matrix, die die Desorption der Sonden durch den Laserstrahl unterstützt, aus einer Lösung aus  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäure in Aceton im Verhältnis 1:9 bis 9:1, vorzugsweise im Verhältnis 1:1, oder einem Gemisch aus  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäuremethylester und  $\alpha$ -Cyano-4-methoxyzimtsäure oder Sinapinsäure oder deren Methylderivate im Verhältnis 1:9 bis 9:1, vorzugsweise im Verhältnis 1:1.

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht die Matrix aus  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäure oder einem Gemisch aus  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäuremethylester und  $\alpha$ -Cyano-4-methoxyzimtsäure oder  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäure oder Sinapinsäure oder deren Methylderivate im Verhältnis 1:99 bis 99:1, vorzugsweise im Verhältnis 1:1, die als Lösung in Aceton, Isopropanol, Acetonitril, Ethanol, Methanol oder Wasser oder in einem Gemisch aus zweien oder mehreren dieser Lösungsmittel auf den MALDI-Probenträger aufgebracht wird.

Das oben beschriebene Prinzip des Massentaggings für bestimmte Bausteine in festgelegten Positionen kann für verschiedene Teilbibliotheken angewendet werden, die dann wiederum zu einer größeren Bibliothek vereinigt werden können.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden deshalb die Sonden als Teilbibliotheken hergestellt, die mit unterschiedlichen Massen- und/oder Ladungs-Tags versehen sind. Um von einer bestimmten analysierten Masse auf eine bestimmte Teilbibliothek rückschließen zu können, müssen auch diese Teilbibliotheken in ihrer Synthese massengelabelt werden. Dies erfolgt zweckmäßig über natürliche Aminosäuren, die sich leicht in einer Festpha-

sensynthese an die PNA Bibliothek binden lassen. Durch das Massenlabels verschiedener Teilbibliotheken lässt sich der Massenbereich, der für die Analyse der Gesamtbibliothek zur Verfügung steht, beträchtlich aufweiten.

5 Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung einen Kit, der die Sonden und/oder einen Probenträger, gegebenenfalls mit den gebundenen Nucleinsäuremolekülen, enthält. Der Proteinträger ist, wie vorstehend dargelegt, oberflächenvorbehandelt und erlaubt so die Bindung der Nucleinsäuren. Vorfzugsweise erfolgt die Vorbehandlung auf chemischem Wege.

10

In dieser Anmeldung ist eine Anzahl von Publikationen genannt, die hiermit per Referenz in die Anmeldung inkorporiert sind.

Die Figuren zeigen:

15

Figur 1

Schema des Fingerprintrings mit massenspektrometrischer Abtastung.

1) Kombinatorisch hergestellte Bibliothek von massenunterscheidbaren Sonden. 2) Die Bibliothek wird an eine Ziel-DNA, die auf einem MALDI target immobilisiert ist, hybridisiert. Nur Sonden mit komplementären Sequenzen zu 20 Sequenzen in der Ziel-DNA setzen sich an der Ziel-DNA fest. Nach intensivem Waschen wird eine MALDI-Matrix aufgebracht. 3) Mit einer Massenanalyse werden die hybridisierten Sonden identifiziert.

25

Figur 2

Schematische Darstellung der Beschichtung eines MALDI-Targets und Immobilisierung eines Arrays von Ziel-DNAs. Der bifunktionale Linker wird bei nicht kovalenter Immobilisierung weggelassen.

30

Figur 3

N-terminales Massen/charge Tagging.

Am 5' einer Nucleinsäure oder einer modifizierten Version einer Nucleinsäure oder am N-terminalen Ende einer PNA kann ein charge tag eingeführt werden.

den. Das charge tag trägt eine N-Hydroxy-succinimidester Funktion und eine quarternäre Ammoniumgruppe. Diese zwei Funktionalisierungen sind durch eine Gruppe R<sub>1</sub> getrennt. R<sub>1</sub> dient der Massenvariation der charge tags (die Kopplung der charge tags wird bei leicht basischem pH (8.5) in wäßriger Lösung auf Eis durchgeführt. Die Reaktion läuft in 30 Minuten vollständig ab).

Figur 4

1:1 Mischung von unmodifizierter PNA und charge tag PNA.

10 Eine charge tag und unmodifizierte PNA sind in einem 1:1 Gemisch mit einer  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäuremethylester Matrix analysiert worden. Die unterschiedliche Empfindlichkeit ist offensichtlich. Die um eine Base verkürzte, gechargezte Fehlersequenz (1983 Da) ergibt ein wesentlich stärkeres Signal als die unmodifizierte Sequenz (2074 Da).

15 Figur 5

Massenverteilung einer 10-mer PNA Bibliothek.

20 Zwei Positionen in der Sequenz sind mit degenerierten Basen (TCGA) synthetisiert. Die Sequenz ist NTTGTTTCN. Dadurch ergeben sich 9 massenunterscheidbare PNAs. In der PNA Bibliothek ist CC = 2810 Da, CT = TC = 2825 Da, CA = AC = 2834 Da, TT = 2840 Da, TA = AT = 2849 Da nicht unterscheidbar von CG = GC = 2850 Da, AA = 2858 Da, TG = GT = 2865 Da, AG = GA = 2874 Da und GG = 2890 Da. Durchwegs wird isotope Auflösung beobachtet. Die ganze PNA Bibliothek ist in einer Eintopfreaktion mit einem charge tag versehen worden. Die MALDI Analyse wurde in einem 1:1 Matrix-25 gemisch von  $\alpha$ -Cyano-4-methoxyzimtsäure und  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäuremethylester durchgeführt.

Figur 6

Massen/charge tagging.

30 Eine 10-mer PNA Bibliothek mit 2 degeneriert synthetisierten Positionen sind mit einem Massen/charge tag gelabelt worden. Die Sequenz ist NTTGTTTCN. Gezeigt ist ein Gemisch von Ausgangsmaterial und gelabelter PNA Bibliothek in einer  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäure Matrix. Der Vorteil

des Anbringens eines Fixladungsträgers an die Bibliothek ist offensichtlich. Die Signale von der charge getagten Bibliothek sind bei gleicher Konzentration detektierbar, während die unmodifizierte PNAs nicht zu detektieren sind. Die um eine Base verkürzte Fehlersequenz ist zu erkennen.

5

Figur 7

Prinzip der Synthese von PNA-Bibliotheken unter Verwendung parallel durchgeföhrter massengelabelter Synthesen sowie massengelabelten Bausteinen L(randomisierte Position). In den randomisierten Positionen werden 10 verschiedene Basen mit jeweils verschiedenen Substituenten am PNA-Rückgrat (als Massentags) verwendet. Die Masse des jeweiligen PNA-Moleküls ist eindeutig dessen Sequenz zugeordnet.

Figur 8

15 Berechnetes MALDI-Massenspektrum einer PNA-Bibliothek.

Zwei verschiedene Festphasensynthesen (eine davon massengelabelt) mit je 32 verschiedenen Sequenzen ergeben 64 verschiedene Massenpeaks, von denen jeder zu einer spezifische Sequenz aus einer PNA-Bibliothek mit 3 variablen Positionen mit vier Basen (jeweils A, C, G und T eingesetzt) zugeordnet ist. Der Rechnung liegen die in Tabelle 1 aufgeführten Substituenten zu 20 grunde. Für die Berechnung wurde das Computerprogramm MASP (© Dr. Christoph Steinbeck) verwendet.

Figur 9

25 Mögliche PNA-Synthesebausteine für die kombinatorische Boc-Festphasensynthese, wie sie auch für die Synthese massenunterscheidbarer PNA-Bibliotheken verwendet werden. Es sind die in Tabelle 1 aufgeführten massengelabelten Bausteine dargestellt.

30 Figur 10

Sequenzanalyse von Sonden durch spezifische Bindungsbrüche.

Die verschiedenen Sequenzen einer Bibliothek von DNA-Sonden können massenspektrometrisch auch durch spezifische Bindungbrüche an den ran-

dominierten Positionen (N = A, G, C oder T) identifiziert werden. Bereits während der Festphasensynthese wird an diesen Positionen eine Phosphorothioatfunktion eingeführt, an der die DNA spezifisch gespalten werden kann (z.B. mit Iodoethanol). Dies ist schematisch, ohne Berücksichtigung der genauen chemischen Beschaffenheit der Fragmente, dargestellt. Die Masse der Fragmente erlaubt, da die Sequenz zum großen Teil bekannt ist, die eindeutige Bestimmung der Gesamtsequenz, ohne daß eine vollständige Sequenzierung erfolgen müßte. Der Substituent R1 bezeichnet eine beliebige weitere DNA-Sequenz, R2 eine weitere beliebige Sequenz oder -H. R3 bezeichnet 10 -OH (Phosphodiester) oder Alkyl- (Alkylphosphonat).

#### Figur 11

"Charge tagged" PNA Sonden Gemisch CCXCAGCC (X= A, G, C, T) hybridisiert an eine Ziel-DNA immobilisiert auf Eupergit, CCCCCAGGCC ist die 15 komplementäre Sequenz. Das untere Spektrum zeigt das Ausgangsgemisch, das obere Spektrum eine deutlich bevorzugte Hybridisierung der komplementären CCCCCAGGCC Sequenz.

#### Figur 12

20 Zur auf dem MALDI-Probenträger immobilisierten Ziel-DNA komplementäre "charge tagged" CCTCAGCC, detektiert nach Aufbringen der 4-Hydroxy- $\alpha$ -cyanoazimtsäure-Matrix ohne Bewegung des Probenträgers während der Messung.

25 Die Beispiele erläutern die Erfindung.

Beispiel 1: Darstellung des gesamten erfindungsgemäßen Verfahrens  
Ein MALDI Target wird mit einer Substanz beschichtet, die eine Immobilisierung eines chemisch modifizierten PCR Produktes erlaubt (z.B. eine NH<sub>2</sub> 30 funktionalisierte Oberfläche). Ein Array von Ziel-DNAs wird auf diese Oberfläche übertragen und gebunden. Das Array wird mit einer Bibliothek von Sonden, die in beschriebener Weise hergestellt wurde, hybridisiert. Komplementäre Bestandteile der Sondenbibliothek binden an die entsprechenden

Ziel-DNAs. Anschließend wird gründlich gewaschen, um nicht gebundene Sonden zu entfernen. Die Matrix wird aufgebracht und das MALDI Target ins Massenspektrometer übertragen. Jeder Punkt, wo sich eine Ziel-DNA befindet wird mit dem Laser angesteuert und eine Massenanalyse der Sonden, die sich an diese Ziel-DNA gebunden haben, durchgeführt.

5 **Beispiel 2:** Analyse einer mit Charge Tags versehenen PNA-Bibliothek  
Eine Bibliothek von PNAs wird in einer Synthese, wie sie hier beschrieben ist, mit Charge Tags versehen. Die Bibliothek von PNAs wird in 50 % Acetonitril 10 gelöst und verdünnt. Die MALDI Matrix (in diesem Fall eine 1:1 Mischung von  $\alpha$ -Cyano-4-methoxyimtsäure und  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäuremethylester in Aceton) wird auf das MALDI Target gegeben. Das Lösungsmittel verdunstet unmittelbar. Danach wird 0.5 ml der CT-PNA Lösung auf auf die getrocknete Matrix gegeben. Nach dem Verdunsten dieses Lösungsmittels wird das 15 MALDI Target ins Massenspektrometer überführt und die Sonde analysiert. Das Resultat ist in Figur 5 gezeigt.

20 **Beispiel 3:** Analyse eines Arrays von Ziel-DNAs durch CT-PNAs  
Eine Bibliothek von CT-PNAs, die auf die beschriebene Weise kombinatorisch hergestellt wurde, wird an ein Array von Ziel-DNAs, das auf einem MALDI Target immobilisiert ist, hybridisiert. Diejenigen Sonden, die eine komplementäre Sequenz in einer Ziel-DNA finden, werden gebunden. Danach wird das MALDI Target gewaschen, um alle übrigen Bestandteile der Bibliothek zu entfernen. Die Matrix wird auf das MALDI Target gegeben und 25 das Target zur Analyse ins Massenspektrometer überführt (Figur 1). Eine unbekannte Ziel-DNA wird durch die hybridisierten Sonden charakterisiert. Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Ziel-DNAs zeichnen sich dadurch aus, daß die gleichen Sonden an sie binden.

30 **Beispiel 4:** Analyse eines Arrays von Ziel-DNAs durch Sonden  
Sonden werden individuell hergestellt und anschließend zu einer Bibliothek vereinigt. Wesentlich ist, daß keine Masse von zwei verschiedenen Sonden belegt wird. Diese Bibliothek von Sonden wird zur Hybridisierung an ein Array

von immobilisierten Ziel-DNAs verwendet. Die nicht gebundenen Sonden werden abgewaschen. Die Matrix wird aufgetragen und die gebundenen Sonden im Massenspektrometer analysiert.

5 Beispiel 5: Herstellung von Teilbibliotheken und MALDI-Analyse

Ein bevorzugtes Beispiel für eine PNA-Bibliothek mit eindeutiger Beziehung der Masse zur Sequenz zeigen Figur 8 und Tabelle 1. In einer sonst beliebigen PNA sollen drei Positionen in der kombinatorischen Festphasensynthese variiert werden. Dies entspricht bei 4 verschiedenen Basen 64 möglichen 10 Verbindungen. Im vorliegenden Beispiel werden zwei getrennte Synthesen mit den in Tabelle 1 gegebenen Bausteinen durchgeführt. Synthese 2 wird zusätzlich durch das Anbringen von zwei Valin-Einheiten massengelabelt. Jede Teilsynthese liefert 32 Verbindungen, die alle über ihre Masse unterscheidbar sind. Beide Teilbibliotheken können nun zur Bibliothek mit 64 verschiedenen 15 Sequenzen mit jeweils spezifischer Masse vereinigt werden.

Das berechnete MALDI-Massenspektrum für diese Bibliothek zeigt Figur 8. Die 64 Peaks überlappen nicht, jeder entspricht einer spezifischen Sequenz aus einer PNA-Bibliothek mit drei randomisierten Basenpositionen (je 4 Basen).

20

Beispiel 6: Behandlung der Oberfläche des MALDI-Probenträgers

In einer bevorzugten Variante des Verfahrens wird die Oberfläche des MALDI-Probenträgers zunächst mit Silikat beschichtet und anschließend mittels Silanisierung Epoxy-funktionalisiert. Alternativ kann auch ein Epoxy-funktionalisiertes Acrylpolymer auf die Metalloberfläche aufgebracht werden. 25 Die Ziel-DNA wird über die Epoxyfunktionen kovalent an die Oberfläche gebunden. In einer besonders bevorzugten Variante wird die zu immobilisierende DNA zuvor mit einer primären Aminofunktion versehen. Die nicht umgesetzten Epoxyfunktionen werden nachfolgend mit einem Überschuß eines 30 Amins desaktiviert und das Verfahren nachfolgend entsprechend Beispiel 4 weitergeführt.

Beispiel 7: Aufbau einer Sondenbibliothek mit 448 Sonden.

7 Synthesen werden nach der im letzten Beispiel beschriebenen Methode durchgeführt und anschließend die Massen/charge tags gekoppelt.

		Massenbereich
5	1. 64 Sonden: charge tag-TCP <sub>1</sub> GAP <sub>2</sub> GAP <sub>3</sub> G	2600-2800 Da
	2. 64 Sonden: charge tag+200 Da mass tag- TCP <sub>1</sub> AGP <sub>2</sub> GAP <sub>3</sub> G	2800-3000 Da
	3. 64 Sonden: charge tag+400 Da mass tag- TCP <sub>1</sub> AGP <sub>2</sub> AGP <sub>3</sub> G	3000-3200 Da
	4. 64 Sonden: charge tag+600 Da mass tag- TCP <sub>1</sub> AAP <sub>2</sub> AGP <sub>3</sub> G	3200-3400 Da
10	5. 64 Sonden: charge tag+800 Da mass tag- TCP <sub>1</sub> AAP <sub>2</sub> GAP <sub>3</sub> G	3400-3600 Da
	6. 64 Sonden: charge tag+1000 Da mass tag- TCP <sub>1</sub> GAP <sub>2</sub> GAP <sub>3</sub> G	3600-3800 Da
	7. 64 Sonden: charge tag+1200 Da mass tag- TCP <sub>1</sub> GAP <sub>2</sub> AGP <sub>3</sub> G	3800-4000 Da

In der vorgenannten Synthese-Serie stellt die sechste Synthese eine interne Kontrolle dar. Alternativ kann auch folgende Synthese durchgeführt werden:  
15 6. 64 Sonden: charge tag+ 1000 Da mass tag- TCP<sub>1</sub>GGP<sub>2</sub>GAP<sub>3</sub>G 3600-3800 Da.

Beispiel 8: Kovalente Immobilisierung einer Ziel-DNA auf einer Metalloberfläche.

20 1. Beschichtung der Metalloberfläche mit Silikat und Silanen:

Variante A:

50 mg Natriumtrisilikat (Aldrich) werden in 600 µL Wasser unter Erwärmen und Mischen gelöst und tropfenweise mit 100 µL Methanol versetzt. Die Lösung darf sich beim Stehenlassen innerhalb von 15 min nicht trüben. Auf die 25 vorgereinigte Platte wird eine gleichmäßige Schicht dieser Lösung mit einem weichen Tuch aufgetragen und bei Raumtemperatur getrocknet. Die Platte wird 15 min bei 50°C weiter getrocknet und in Methanol gewaschen. Dann wird nochmals 15 min auf 50°C erwärmt und unpolymerisiertes Silikat mit Wasser abgewaschen. Die "verglaste" Metallplatte wird 20 min mit einer Lösung von 3-(Aminopropyl)-triethoxysilan (2% in Aceton:Wasser / 95:5) behandelt, mit Methanol gewaschen und bei 50°C getrocknet.  
30

Variante B: (bevorzugte Variante)

Der Silikatlösung wie unter A) beschrieben werden 5% 3-(Aminopropyl)-triethoxysilan zugesetzt und mit einem weichen Tuch eine gleichmäßige

Schicht auf die Metallplatte aufgebracht. Nach dem Trocknen bei Raumtemperatur wird die Oberfläche für 30 s den Dämpfen konz. Salzsäure ausgesetzt, worauf sie sich milchig trübt. Die Platte wird 15 min bei 50°C getrocknet, mit Methanol und Wasser gewaschen und nachfolgend erneut getrocknet.

5

**Variante C:**

Die vorgereinigte Metallplatte wird in einer Lösung von 3-(Aminopropyl)-triethoxysilan (2% in Aceton:Wasser / 95:5) 30 min silanisiert. Die Platte wird getrocknet, mit Methanol gewaschen, auf 50°C 15 min erwärmt und mit Wasser gewaschen.

10

**Variante D:**

Analog zu den Varianten A, B und C ist die Funktionalisierung mit Thiolen durch Verwendung von 3-(Mercaptopropyl)-triethoxysilan möglich.

15 **2. Vorbehandlung eines metallischen Trägers mit Epoxysilanen:**

Ein metallischer Probenträger wird wie oben beschrieben mit Silikat beschichtet. Die Oberfläche wird mehrfach mit bidestilliertem Wasser gewaschen. Der getrocknete Probenträger wird mit einem 1:1-Gemisch aus 3-Glycidyloxypropyl-trimethoxysilan und Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silan (0.5µl/mm<sup>2</sup>) beschichtet und auf der Heizplatte 40 min. inkubiert. Die Plates werden gründlich mit Aceton gewaschen, 15 min. bei 55 °C getrocknet und um Vakuum aufbewahrt.

20

**3. Funktionalisierung von DNA mit einem Linker:**

25 **Variante A:**

Mit einer Phosphorothioat-Brücke synthetisierte DNA wird mit einem Überschuß SIAB (4-(Iodacetamido)-benzoësäure N-hydroxysuccinimidylester, Pierce Chemical, Rockford, IL, USA) in DMF funktionalisiert. Das Lösemittel wird im Vakuum abgedampft, der gelbliche Rückstand mehrfach mit Essigsäureethylester gewaschen und anschließend getrocknet. Unter diesen Bedingungen reagiert ausschließlich die Iodacetamido-Funktion. Der N-Hydroxy-succinimidester bleibt für die Weiterreaktion mit Aminofunktionen im Zuge der Immobilisierung erhalten.

**Variante B:**

Das aminofunktionalisierte Oligonucleotid wird mit einem Überschuß SIAB in wasserfreiem DMSO bei Raumtemperatur umgesetzt. Die Aufreinigung erfolgt wie unter A). Unter diesen Bedingungen reagiert SIAB zu ca. 50% mit seiner 5 Iodoacetamido- und zu ca. 50% mit N-Hydroxy-succinimidester Funktion. Die Immobilisierung kann dann umgekehrt an einer entsprechend 1.D behandelten Metallplatte erfolgen.

**Variante C:**

Die Varianten A) und B) können auch analog mit Halogenalkylcarbonsäure-10 NHS-Estern durchgeführt werden. Es sind jedoch längere Reaktionszeiten und erhöhte Temperaturen erforderlich.

**4. Bindung von DNA an vorbehandelte Metallplatten:****Variante A:**

15 Die funktionalisierte DNA wird in einer gesättigten Lösung von Natriumacetat in wasserfreiem DMSO gelöst und auf die beschichtete Metallplatte aufgebracht. Nach 30 min Reaktionszeit wird das verbliebene Lösemittel entfernt und die Metallplatte zuerst mit 1 M Ammoniumchloridlösung und dann mit bi-destilliertem Wasser derart gewaschen, daß eine gegenseitige Kontamination 20 der benachbarten Spots vermieden wird. Dieser Vorgang wird dreimal wiederholt. Dann wird mit viel bidestilliertem Wasser nachgespült und die Metallplatte bis zur anschließenden Hybridisierung im Vakuum aufbewahrt.

**Variante B:**

Analog zu A) ist auch die nicht kovalente Immobilisierung mit unmodifizierter 25 DNA möglich. In diesem Fall wird im Waschprozeß auf die 1 M Ammoniumchloridlösung verzichtet.

**Variante C:**

Die Immobilisierung von Ziel-DNA auf MALDI-Targets kann auch folgendermaßen durchgeführt werden. Die Amino-funktionalisierte DNA (1,5 nmol) wird 30 in Immobilisierungspuffer (1M K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>/KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> pH 7,5) aufgenommen. Die durch Silanisierung funktionalisierten Oberflächen werden mit dieser Lösung überschichtet und 16-20 h bei Raumtemperatur stehengelassen. Die Plates

werden anschließend mehrfach mit dem Hybridisationspuffer gewaschen und getrocknet.

**Variante D:**

Die Immobilisierung von Ziel-DNA an einer Epoxyfunktionalisierten Festphase kann wie folgt durchgeführt werden. 10 mg Support (Eupergit C250 L, Röhm Pharma Polymere) werden in 1 ml Immobilisierungspuffer (1M  $K_2HPO_4/KH_2PO_4$  H 7,5) suspendiert. 1,5 nmol der zu immobilisierenden Ziel-DNA werden zugesetzt und 24 h bei Raumtemperatur unter sanftem Schütteln inkubiert. Der Überstand wird abgenommen und die nicht umgesetzten Epoxyfunktionen durch Behandlung mit 1 M Glycinlösung bei Raumtemperatur 24 h desaktiviert. Der Überstand wird abgenommen, der Support mehrfach gewaschen. Die immobilisierte DNA kann so bei  $-20^{\circ}C$  über längere Zeit aufbewahrt werden.

**15 5. Hybridisierung und Probenaufbereitung:**

Die Hybridisierung an die immobilisierte Ziel-DNA mit PNA-Sonden (oder Nucleinsäure-Sonden) erfolgt in PBS-Puffer bei einer den jeweiligen Sonden angepaßten Temperatur. Das Target wird mehrfach zuerst mit PBS-Puffer, dann mit bidestilliertem Wasser nachgewaschen. Die Metallplatte wird im Vakuum getrocknet und anschließend mit der MALDI-Matrix ( $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäure, 1% in Aceton; oder analog der entsprechende Methylester für das Verfahren mit "charge tagged" PNAs/Nucleinsäuren, oder als bevorzugte Variante ein 1:1 Gemisch des  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäuremethylesters mit  $\alpha$ -Cyano-4-methoxyzimtsäure für die "charge tagged" PNAs) getrennt für jeden Spot beschichtet. Alternativ kann auch eine flächige Beschichtung mit einem Matrix-Spray durchgeführt werden. Durch den schnellen Trocknungsprozeß wird eine Diffusion innerhalb des Arrays vermieden.

**30 5. Bevorzugte Variante**

In der bevorzugten Variante erfolgt die Bindung einer mit einer Phosphorothioat-Brücke synthetisierten und mit SIAB nach 2.A funktionalisierten DNA an eine nach 1.B hergestellten Oberfläche auf einer Metallplatte durch Reak-

tion in wasserfreiem DMSO bei Raumtemperatur (30 min). Nach der Hybridisierung mit der charge getagten Sonden-PNA/DNA wird das MALDI-Target mit bidestilliertem Wasser gewaschen, getrocknet und flächig getrennt für jeden Spot mit einem Gemisch aus  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäuremethylester und  $\alpha$ -Cyano-4-methoxyzimtsäure (wie unter 4.) beschichtet.

#### 6. Proteinbeschichtung:

Eine weitere Variante besteht darin die Metalloberfläche das MALDI Targets mit Protein zu beschichten. Gene32, ein Protein das sequenzspezifisch 10 einzelsträngige DNA bindet, ist dazu geeignet. Nach der Beschichtung des Targets mit diesem Protein kann ein Array von Ziel-DNAs daraufgelegt werden. Wenn das Array der Ziel-DNAs aus cDNA besteht, sind diese in der PCR mit oligo-dT (z.B. dTTTTTTTTTTTT) geprämt worden. Oligo-dT wechselt stark mit Gene32. Die kovalente Bindung des oligo-dT zum gene32 15 kann durch ein Photocrosslinking mit kurzem UV-Licht erreicht werden.<sup>36,37</sup> Nach dieser Immobilisierung auf dem MALDI Target kann eine Bibliothek von Sonden in der beschriebenen Art zur Analyse des Arrays von Ziel-DNAs verwendet werden. Es bieten sich auch sequenzspezifische Protein/DNA-Wechselwirkungen an, wie z.B. GCN4/AP1.

20

Eine weitere Variante ist eine biotinylierte Ziel-DNA an ein mit Streptavidin beschichtetes magnetic bead zu binden. Diese Ziel-DNA wird mit einer Sondenbibliothek analysiert und anschließend die magnetischen Teilchen auf das MALDI Target übertragen, wo die Sonden durch die Matrix und leichtes 25 Aufheizen auf die Matrix übertragen werden.

Base	Position 1	Position 2	Position 3
A	H	<i>i</i> Pr	H
T	H	Me	<i>i</i> PrOCH <sub>2</sub>
C	H	H	<i>i</i> PrOCH <sub>2</sub> *
G	H	<i>i</i> Bu	H *

Tabelle 1: An den PNA-Untereinheiten angebrachte Substituenten zur Herstellung einer massengelabelten Bibliothek mit eindeutiger Massen/Sequenz Beziehung. \* : Zweite Synthese, mit 2 Valin-Einheiten massengelabelt. Die 5 entsprechenden Synthesebausteine zeigt Fig. 9.

Literatur

1 <sup>5</sup> Hoheisel, J.D. and Lehrach, H. 1993. Use of reference libraries and hybridisationfingerprint for relational genome analysis. FEBS. 325: 118-122.

2 <sup>10</sup> Scholler, P., Karger, A.E., Meier-Ewert, S., Lehrach, H., Delius, H. and Hoheisel, J.D. 1995. Fine-mapping of shotgun template-libraries; an efficient strategy for the systematic sequencing of genomic DNA. Nucleic Acids Res. 23: 3842-3849.

3 <sup>15</sup> Brenner, S. 1994. Methods for sorting polynucleotides using oligonucleotide tags. US Patent. 5,604,097.

4 <sup>20</sup> Brenner, S. 1995. Minimally cross-hybridizing sets of oligonucleotide tags. US Patent. 5,635,400.

5 <sup>25</sup> Guo, Z., Guilfoyle, R.A., Thiel, A.J., Wang, R. and Smith, L.M. 1994. Direct fluorescence analysis of genetic polymorphisms by hybridization with oligonucleotides arrays of glass supports. Nucleic Acids Res. 22: 5456-5465.

6 <sup>30</sup> Church, G.M. and Kieffer-Higgins, S. 1988. Multiplex DNA sequencing. Science. 240: 185-188.

7 <sup>35</sup> Church, G.M. and Kieffer-Higgins, S. 1990. Multiplex analysis of DNA. US Patent. 5,149,625.

8 <sup>40</sup> Arlinghaus, H.F., Kwoka, M.N., Guo, X.-Q. and Jacobson, K.B. 1997. Multiplex DNA sequencing and diagnostics by hybridization with enriched stable isotope labels. Anal. Chem. 69: 1510-1517.

9 <sup>45</sup> Nielsen, P.E., Buchardt, O., Egholm, M. and Berg, R.H. 1993. Peptide nucleic acids. US Patent. 5,539,082.

10 Buchardt, O., Egholm, M., Berg, R.H. and Nielsen, P.E. 1993. Peptide nucleic acids and their potential applications in biotechnology. Trends in Biotechnology, 11: 384-386.

11 Karas, M. and Hillenkamp, F. 1988. Laser desorption ionization of proteins with molecular masses exceeding 10000 daltons. Anal. Chem. 60: 2299-2301.

12 Vestal, M.L., Juhasz, P. and Martin, S.A. 1995. Delayed extraction matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom. 9: 1044-1050.

13 Gut, I.G. and Beck, S. 1995. DNA and Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry. Molecular Bioogy: Current Innovations and Future Trends. 1: 147-157.

<sup>14</sup> Gut, I.G. and Beck, S. 1995. A procedure for selective DNA alkylation and detection by mass spectrometry. *Nucleic Acids Res.* 23: 1367-1373.

5 <sup>15</sup> Gut, I.G. and Beck, S. 1995. Method of nucleic acid analysis. Patent WO96/27681.

10 <sup>16</sup> Gut, I.G., Jeffery, W.A., Pappin, D.J.C. and Beck, S. 1997. Analysis of DNA by 'charge tagging' and matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 11: 43-50.

15 <sup>17</sup> Butler, J.M., Jiang-Baucom, P., Huang, M., Belgrader, P. and Girard, J. 1996. Peptide nucleic acid characterization by MALDI-TOF mass spectrometry. *Anal. Chem.* 68: 3283-3287.

20 <sup>18</sup> Keough, T., Baker, T.R., Dobson, R.L.M., Lacey, M.P., Riley, T.A., Hasselfield, J.A. and Hesselberth, P.E. 1993. Antisense DNA oligonucleotides II: the use of matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry for the sequence verification of methylphosphonate oligodeoxyribonucleotides. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 7: 195-200.

25 <sup>19</sup> Ross, P.L., Lee, K. and Belgrader, P. 1997. Discrimination of single-nucleotide polymorphisms in human DNA using peptide nucleic acid probes detected by MALDI-TOF mass spectrometry. *Anal. Chem.* 69: 4197-4202.

30 <sup>20</sup> Lowe, G. 1995. Combinatorial Chemistry. *Chem. Soc. Rev.* 24: 309.

35 <sup>21</sup> Jung, G., Früchtel, J.S. 1996. Organische Chemie an fester Phase. *Angew. Chem.* 108: 19-46.

40 <sup>22</sup> Choong, I.C., Ellman, J.A. 1996. Solid-Phase Synthesis: Applications to Combinatorial Libraries. *Ann. Reports in Med. Chem.* 31: 309.

45 <sup>23</sup> Pirrung, M.C. 1997. Spatially Addressable Combinatorial Libraries. *Chem. Rev.* 97: 473.

<sup>24</sup> Cook, P.D., Kiely, J. and Sprankle, K. 1994. Peptide nucleic acid combinatorial libraries and improved methods of synthesis. US Patent. 5,539,083.

50 <sup>25</sup> Nielsen, P.E. Peptide nucleic acids: a new dimension to peptide libraries and aptamers. *Methods in Enzymology.* 426-433.

<sup>26</sup> Metzger, J.W., Stevanovic, S., Brünjes, J., Wiesmüller, K.-H., Jung, G. 1994. Electrospray Mass Spectrometry and Multiple Sequence Analysis of Synthetic Peptide Libraries. *Methods: A Companion to Methods in Enzymology* 6: 425-431.

<sup>27</sup> Loo, J.A., DeJohn, D.E., Andrews, P.C. 1996. Application of Mass Spectrometry for Characterizing and Identifying Ligands from Combinatorial Libraries. *Ann. Reports in Med. Chem.* 31:319.

<sup>28</sup> Pomerantz, S.C., McCloskey, J.A., Eaton, B.C., 1997. Deconvolution of Combinatorial Oligonucleotide Libraries by Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry. *J. Am. Chem. Soc.* 119: 3861.

5 <sup>29</sup> Carr, S.A., Benkovic, S.J., Winograd, N. 1996. Evaluation of Mass Spectrometric Methods Applicable to the Direct Analysis of Non-Peptide Bead-Bound Combinatorial Libraries. *Anal. Chem.* 68: 237.

10 <sup>30</sup> Uhlen, M. et al. 1988, *Nucleic Acids Res.* 16, 3025-3038.

15 <sup>31</sup> Chrisey, L.A., Lee, G.U. and O'Ferrall, C.E. 1996. Covalent attachment of synthetic DNA to self-assembled monolayer films. *Nucleic Acids Res.* 24: 3031-3039.

15 <sup>32</sup> Timofeev, E.N., Kochetkova, S.V., Mirzabekov, A.D. und Florentiev, V.L. 1996. Regioselective immobilization of short oligonucleotides to acrylic co-polymer gels. *Nucleic Acids Res.* 24: 3142-3148.

20 <sup>33</sup> O'Donnell, M.J., Tang, K., Köster, H., Smith, C.L. and Cantor, C.R. 1997. High-density, covalent attachment of DNA to silicone wafers for analysis by MALDI-TOF mass spectrometry. *Anal. Chem.* 69: 2438-2443.

25 <sup>34</sup> Cantor, C.R. 1995. Methods of preparing probe array by hybridization. US Patent. 5,631,134.

30 <sup>35</sup> Bruick, R.K., Koppitz, M., Joyce, G.F. and Orgel, L.E. 1997. A simple procedure for constructing 5'-amino-terminated oligodeoxynucleotides in aqueous solution. *Nucleic Acids Res.* 25: 1309-1310.

30 <sup>36</sup> Hockensmith, J.W., Kubasek, W.L., Vorachek, W.R. and von Hippel, P.H. 1993. Laser cross-linking of proteins to nucleic acids. *J. Bio. Chem.* 268: 15712-15720.

35 <sup>37</sup> von Hippel, P.H. 1994. Protein-DNA recognition: New perspectives and underlying themes. *Science.* 263: 769-770.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Nachweis einer Nucleotidsequenz in einem Nucleinsäuremolekül, das die folgenden Schritte umfaßt:
  - 5 (a) Hybridisierung von Nucleinsäuremolekülen mit einem Satz von Sonden unterschiedlicher Nucleobasensequenzen, wobei jede Sonde eine von allen anderen Sonden verschiedene Masse aufweist;
  - (b) Abtrennung der nicht hybridisierten Sonden;
  - 10 (c) Kontaktierung der hybridisierten Sonden mit einer Matrix, welche die Desorption der Sonden durch einen Laserstrahl unterstützt;
  - (d) Analyse der hybridisierten und von der Matrix umgebenen Sonden auf einem aus elektrisch leitfähigem Material bestehenden Probenträger in einem Massenspektrometer; und
  - 15 (e) Bestimmung der Nucleinsäuremoleküle, welche die Sequenz aufweisen,  
wobei die Positionen der Sonden auf dem Probenträger eine Zuordnung zu dem damit hybridisierenden Nucleinsäuremolekül erlaubt.
- 20 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Nucleinsäuremoleküle vor oder nach Schritt (a) auf die Oberfläche eines Trägers übertragen werden.
3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Oberfläche des Trägers die Oberfläche des aus elektrisch leitfähigem Material bestehenden Probenträgers ist.
- 25 4. Verfahren nach Anspruch 2, wobei vor Schritt (c) der Träger mit den an seiner Oberfläche aufgebrachten Nucleinsäuremolekülen, die die hybridisierten Sonden tragen, auf den aus leitfähigem Material bestehenden Probenträger aufgebracht wird.
- 30 5. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die hybridisierten Sonden vor dem, nach dem oder durch den Kontakt mit der Matrix in Schritt (c) von den

immobilisierten Nucleinsäuremolekülen abgelöst und auf den aus leitfähigem Material bestehenden Probenträger aufgebracht werden.


6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Probenträger eine metallische, eine mit Glas beschichtete oder eine chemisch modifizierte Oberfläche aufweist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Immobilisierung der Nucleinsäuremoleküle an der Probenträgeroberfläche über eine  $\text{NH}_2$ -, Epoxy- oder SH-Funktion, mittels der Beschichtung der Probenträgeroberfläche mit einem Silikat oder Silan, über eine Protein-Substrat-, Protein-Protein- oder eine Protein-Nucleinsäure-Interaktion, oder über eine Wechselwirkung zweier hydrophober Komponenten erfolgt.
8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Protein-Substrat-Interaktion eine Biotin-Streptavidinbindung oder eine Antikörper-Antigenbindung ist.
9. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Protein-Nucleinsäureinteraktion eine Gene32-Nucleinsäurebindung ist.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Sonden Nucleinsäuren sind, die mit einem Massen-Tag versehen sind.
11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Massen-Tag zugleich Ladungs-Tag ist.
12. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Nucleinsäuren zusätzlich mit einem Ladungs-Tag versehen sind.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei die Sonden modifizierte Nucleinsäuremoleküle sind.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die modifizierten Nucleinsäuremoleküle PNAs, alkylierte Phosphorothioatnucleinsäuren oder Alkylphosphonatnucleinsäuren sind.
- 5 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei die Sonden durch kombinatorische Festphasen-Synthese hergestellt werden.
- 10 16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei unterschiedliche Basenbausteine derart markiert sind, daß die aus ihnen synthetisierten Sonden jeweils über ihre Massen im Massenspektrometer unterscheidbar sind.
- 15 17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei die Markierung eine Methyl-, Ethyl-, Propyl-, eine verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, eine halogensubstituierte verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, Alkoxyalkyl-, Alkylaryl-, Arylalkyl-, Alkoxyaryl- oder Aryloxyalkylgruppe ist, oder eine von deren deuterierten oder sonstigen isotopen Varianten..
- 20 18. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 17, wobei die Sonden mit mindestens einer Modifikation in einer definierten Position von randomisierten Nucleotiden entfernt versehen sind, die eine Spaltung der Sonde erlaubt.
- 25 19. Verfahren nach Anspruch 18, wobei die Modifikation die Einführung einer Phosphorothioatgruppe und/oder einer RNA-Base und/oder einer Phosphotriesterbindung in die Sonde ist.
- 30 20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, wobei die Matrix eine Lösung aus  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäure in Aceton im Verhältnis 1:9 bis 9:1, vorzugsweise im Verhältnis 1:1, oder ein Gemisch aus  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäuremethylester und  $\alpha$ -Cyano-4-methoxyzimtsäure oder Sinapinsäure oder deren Methylderivate im Verhältnis 1:9 bis 9:1, vorzugsweise im Verhältnis 1:1, ist.


21. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, wobei die Matrix  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäure oder ein Gemisch aus  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäuremethylester und  $\alpha$ -Cyano-4-methoxyzimtsäure oder  $\alpha$ -Cyano-4-hydroxyzimtsäure oder Sinapinsäure oder deren Methylde-  
5 rivate im Verhältnis 1:99 bis 99:1, vorzugsweise im Verhältnis 1:1 ist, die als Lösung in Aceton, Isopropanol, Acetonitril, Ethanol, Methanol oder Wasser oder in einem Gemisch aus zweien oder mehreren dieser Lösungsmittel auf den MALDI-Probenträger aufgebracht wird.
- 10 22. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 21, wobei die Sonden als Teilbibliotheken hergestellt werden, die mit unterschiedlichen Massen- und/oder Ladungs-Tags versehen sind.
23. Kit enthaltend
  - 15 (a) einen Satz von Sonden wie definiert in einem der Ansprüche 11 bis 18 und/oder
  - (b) einen Probenträger, der vorbehandelt ist und dadurch die Bindung eines Arrays von Ziel-DNAs erlaubt und/oder bereits gebundene Ziel-DNAs enthält.

1/12

## 1) Massenverteilung der Proben



## 2) Hybridisierung



## 3) Massenverteilung hybridisierte Proben




Fig. 1

2/12

Immobilisierung von DNA direkt auf dem MALDI-Target (Beispiel).





Fig. 2


3/12

## N-terminales Massen/Charge Tagging

Fig. 3



R = z.1. alkyl, -CH<sub>2</sub>J, -C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, -C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>, -C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>, etc.



$R_{2,4}$  = z.B. alkyl, substituierter alkyl

$R_3$  = z.B. Nukleinsäure, PNA, Methylphosphonatnukleinsäure, Phosphorothioatnukleinsäure




Fig. 4

5/12




Fig. 5

6/12






Fig. 6

7/12

Synthesis 1:



Synthesis 2:



....Synthesis n:



designate PNA-Bibliothek  
mit Sequenz-spezifischen  
Massen

B = Adenin, Cytosin, Guanin, Thymin oder Purin-oder Pyrimidinderivate oder deren Deazaanaloge

L(n) sind verschiedene Sets von Substituenten, spezifisch ausgewählt für jede Base, die in jedem Syntheseschritt eingesetzt wird, um minimierte Peak-Überlappungen in der MALDI-MS zu erhalten

Fig. 7

8/12




Fig. 8

9/12




Fig. 9

10/12






Fig. 10

Figur 11



Figur 12



**PCT**WELTOORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> : <b>C12Q 1/68</b>		A3	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 99/29898</b>
			(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: <b>17. Juni 1999 (17.06.99)</b>
(21) Internationales Aktenzeichen: <b>PCT/EP98/07911</b>		(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 4. Dezember 1998 (04.12.98)			
(30) Prioritätsdaten: 97121471.3 5. Dezember 1997 (05.12.97) EP		<b>Veröffentlicht</b> <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>	
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. [DE/DE]; Berlin (DE).		(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: <b>28. Oktober 1999 (28.10.99)</b>	
(72) Erfinder; und			
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GUT, Ivo, Glynne [CH/DE]; Hackerstrasse 1, D-12161 Berlin (DE). BERLIN, Kurt [DE/DE]; Marienkäferweg 4, D-14532 Stahnsdorf (DE). LEHRACH, Hans [AT/DE]; Lützelsteinerweg 50, D-14195 Berlin (DE).			
(74) Anwalt: VOSSIUS & PARTNER; Siebertstrasse 4, D-81675 München (DE).			
(54) Title: METHOD FOR IDENTIFYING NUCLEIC ACIDS BY MEANS OF MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONISATION MASS SPECTROMETRY			
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR IDENTIFIKATION VON NUCLEINSÄUREN DURCH MATRIX-ASSISTIERTE LASER DESORPTIONS/IONISATIONS MASSENSPEKTROMETRIE			
C / Immobilisierung von DNA direkt auf dem MALDI-Target (Beispiel).			
<p>D / gebundene DNA</p> <p>E / bifunktionaler Linker</p> <p>A / funktionalisierte Schicht, hergestellt aus Silanen</p> <p>B / Glas/Silikatbeschichtung (optional)</p> <p>MALDI-Target (Metall)</p>			
<p>A ... FUNCTIONALIZED LAYER MADE OF SILANE</p> <p>B ... GLAS/SILICATE COATING (OPTIONAL)</p> <p>C ... IMMobilization of DNA DIRECTLY onto the MALDI-TARGET (EXAMPLE)</p> <p>D ... BONDED DNA</p> <p>E ... BIFUNCTIONAL LINKER</p>			
(57) Abstract			
<p>The present invention relates to a method for detecting a nucleotide sequence in a nucleic acid molecule by means of predetermined probes of varying mass using matrix-assisted spectrometry. One advantage of the inventive method is that it provides for simultaneous characterization of a plurality of unknown nucleic acid molecules by a salt from various probes. The invention also relates to a kit containing the probes and/or a sample carrier, optionally with nucleic acids bonded thereto.</p>			

**(57) Zusammenfassung**

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nachweis einer Nucleotidsequenz in einem Nucleinsäuremolekül mittels vorbestimmter Sonden unterschiedlicher Masse durch Matrix-assistierte Laser Desorptions/Ionisations Massenspektrometrie. Vorteilhaftweise erlaubt das erfundungsgemäße Verfahren die gleichzeitige Charakterisierung einer Vielzahl unbekannter Nucleinsäuremoleküle durch einen Satz verschiedener Sonden. Weiterhin betrifft diese Erfindung einen Kit, der die Sonden und/oder einen Probenträger, gegebenenfalls mit daran gebundenen Nucleinsäuremolekülen, enthält.

**LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 98/07911

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 6 C12Q1/68

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 C12Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>LITTLE D P ET AL: "MALDI ON A CHIP: ANALYSIS OF ARRAYS OF LOW-FEMTOMOLE TO SUBFEMTOMOLE QUANTITIES OF SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDES AND DNA DIAGNOSTIC PRODUCTS DISPENSED BY A PIEZOELECTRIC PIPET" ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 69, no. 22, 15 November 1997 (1997-11-15), pages 4540-4546, XP000727173 ISSN: 0003-2700 the whole document</p> <p>---</p> <p style="text-align: center;">-/--</p>	1-23

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 August 1999

Date of mailing of the international search report

09/09/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hagenmaier, S

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte onal Application No  
PCT/EP 98/07911

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	GRIFFIN ET AL.: "GENETIC ANALYSIS BY PEPTIDE NUCLEIC ACID AFFINITY MALDI-TOF MASS SPECTROMETRY" NATURE BIOTECHNOLOGY, vol. 15, December 1997 (1997-12), pages 1368-1372, XP002113517 the whole document ---	1-23
Y	ROSS ET AL.: "DISCRIMINATION OF SINGLE-NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS IN HUMAN DNA USING PEPTIDE NUCLEIC ACID PROBES DETECTED BY MALDI-TOF MASS SPECTROMETRY" ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 69, no. 20, October 1997 (1997-10), pages 4197-4202, XP002113518 the whole document ---	1-23
Y	ROSS P L & BELGRADER P: "ANALYSIS OF SHORT TANDEM REPEAT POLYMORPHISMS IN HUMAN DNA BY MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONIZATION MASS SPECTROMETRY" ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 69, 1 October 1997 (1997-10-01), pages 3966-3972, XP002094185 ISSN: 0003-2700 the whole document ---	1-23
Y	GUT ET AL.: "ANALYSIS OF DNA BY "CHARGE TAGGING" AND MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONIZATION MASS SPECTROMETRY " RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, vol. 11, 1997, pages 43-50, XP002113519 the whole document ---	1-23
Y	EP 0 524 808 A (HOFFMANN LA ROCHE ;UNIV NEW YORK (US)) 27 January 1993 (1993-01-27) the whole document ---	9
A	KÖSTER ET AL.: "A STRATEGY FOR RAPID AND EFFICIENT DNA SEQUENCING BY MASS SPECTROMETRY" NAT.BIOTECH., vol. 14, 1996, pages 1123-1128, XP002113520 the whole document ---	
		-/-

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte onal Application No

PCT/EP 98/07911

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>ARLINGHAUS H F ET AL: "MULTIPLEXED DNA SEQUENCING AND DIAGNOSTICS BY HYBRIDIZATION WITH ENRICHED STABLE ISOTOPE LABELS" ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 69, no. 8, 15 April 1997 (1997-04-15), pages 1510-1517, XP000690164 ISSN: 0003-2700 the whole document</p> <p>---</p>	
A	<p>WO 95 04160 A (ISIS INNOVATION ;SOUTHERN EDWIN (GB); CUMMINS WILLIAM JONATHAN (GB) 9 February 1995 (1995-02-09) the whole document</p> <p>---</p>	
A	<p>WO 96 27681 A (IMP CANCER RES TECH ;GUT IVO GLYNNE (GB); BECK STEPHAN AUGUST (GB)) 12 September 1996 (1996-09-12) the whole document</p> <p>---</p>	
P, A	<p>WO 98 31830 A (BRAX GENOMICS LTD ;THOMPSON ANDREW HUGIN (GB); SCHMIDT GUENTER (GB) 23 July 1998 (1998-07-23) the whole document</p> <p>---</p>	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 98/07911

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0524808	A	27-01-1993	AU 645915 B AU 2041992 A CA 2074214 A CA 2218875 A DE 69227076 D DE 69227076 T EP 0863213 A ES 2123542 T JP 2084412 C JP 5336971 A JP 8000073 B US 5538871 A	27-01-1994 25-02-1993 24-01-1993 24-01-1993 29-10-1998 02-06-1999 09-09-1998 16-01-1999 23-08-1996 21-12-1993 10-01-1996 23-07-1996
WO 9504160	A	09-02-1995	AT 159767 T AU 695349 B AU 7269194 A CA 2168010 A CN 1131440 A DE 69406544 D DE 69406544 T DK 711362 T EP 0711362 A EP 0778280 A ES 2108479 T FI 960403 A HU 73802 A JP 9501830 T NO 960370 A US 5770367 A	15-11-1997 13-08-1998 28-02-1995 09-02-1995 18-09-1996 04-12-1997 26-02-1998 22-12-1997 15-05-1996 11-06-1997 16-12-1997 29-01-1996 30-09-1996 25-02-1997 28-03-1996 23-06-1998
WO 9627681	A	12-09-1996	EP 0813609 A JP 11500924 T	29-12-1997 26-01-1999
WO 9831830	A	23-07-1998	AU 5570098 A WO 9932501 A	07-08-1998 01-07-1999

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/07911

## A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 C12Q1/68

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 C12Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	<p>LITTLE D P ET AL: "MALDI ON A CHIP: ANALYSIS OF ARRAYS OF LOW-FEMTOMOLE TO SUBFEMTOMOLE QUANTITIES OF SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDES AND DNA DIAGNOSTIC PRODUCTS DISPENSED BY A PIEZOELECTRIC PIPET"</p> <p>ANALYTICAL CHEMISTRY, Bd. 69, Nr. 22, 15. November 1997 (1997-11-15), Seiten 4540-4546, XP000727173</p> <p>ISSN: 0003-2700 das ganze Dokument</p> <p>---</p> <p>-/-</p>	1-23

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldeatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldeatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

27. August 1999

09/09/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hagenmaier, S

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP 98/07911

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	GRIFFIN ET AL.: "GENETIC ANALYSIS BY PEPTIDE NUCLEIC ACID AFFINITY MALDI-TOF MASS SPECTROMETRY" NATURE BIOTECHNOLOGY, Bd. 15, Dezember 1997 (1997-12), Seiten 1368-1372, XP002113517 das ganze Dokument ---	1-23
Y	ROSS ET AL.: "DISCRIMINATION OF SINGLE-NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS IN HUMAN DNA USING PEPTIDE NUCLEIC ACID PROBES DETECTED BY MALDI-TOF MASS SPECTROMETRY" ANALYTICAL CHEMISTRY, Bd. 69, Nr. 20, Oktober 1997 (1997-10), Seiten 4197-4202, XP002113518 das ganze Dokument ---	1-23
Y	ROSS P L & BELGRADER P: "ANALYSIS OF SHORT TANDEM REPEAT POLYMORPHISMS IN HUMAN DNA BY MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONIZATION MASS SPECTROMETRY" ANALYTICAL CHEMISTRY, Bd. 69, 1. Oktober 1997 (1997-10-01), Seiten 3966-3972, XP002094185 ISSN: 0003-2700 das ganze Dokument ---	1-23
Y	GUT ET AL.: "ANALYSIS OF DNA BY "CHARGE TAGGING" AND MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONIZATION MASS SPECTROMETRY " RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, Bd. 11, 1997, Seiten 43-50, XP002113519 das ganze Dokument ---	1-23
Y	EP 0 524 808 A (HOFFMANN LA ROCHE ;UNIV NEW YORK (US)) 27. Januar 1993 (1993-01-27) das ganze Dokument ---	9
A	KÖSTER ET AL.: "A STRATEGY FOR RAPID AND EFFICIENT DNA SEQUENCING BY MASS SPECTROMETRY" NAT.BIOTECH., Bd. 14, 1996, Seiten 1123-1128, XP002113520 das ganze Dokument ---	

-/-

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/07911

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	ARLINGHAUS H F ET AL: "MULTIPLEXED DNA SEQUENCING AND DIAGNOSTICS BY HYBRIDIZATION WITH ENRICHED STABLE ISOTOPE LABELS" ANALYTICAL CHEMISTRY, Bd. 69, Nr. 8, 15. April 1997 (1997-04-15), Seiten 1510-1517, XP000690164 ISSN: 0003-2700 das ganze Dokument ---	
A	WO 95 04160 A (ISIS INNOVATION ;SOUTHERN EDWIN (GB); CUMMINS WILLIAM JONATHAN (GB) 9. Februar 1995 (1995-02-09) das ganze Dokument ---	
A	WO 96 27681 A (IMP CANCER RES TECH ;GUT IVO GLYNNE (GB); BECK STEPHAN AUGUST (GB)) 12. September 1996 (1996-09-12) das ganze Dokument ---	
P,A	WO 98 31830 A (BRAX GENOMICS LTD ;THOMPSON ANDREW HUGIN (GB); SCHMIDT GUENTER (GB) 23. Juli 1998 (1998-07-23) das ganze Dokument -----	

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/07911

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0524808	A 27-01-1993	AU 645915	B	27-01-1994
		AU 2041992	A	25-02-1993
		CA 2074214	A	24-01-1993
		CA 2218875	A	24-01-1993
		DE 69227076	D	29-10-1998
		DE 69227076	T	02-06-1999
		EP 0863213	A	09-09-1998
		ES 2123542	T	16-01-1999
		JP 2084412	C	23-08-1996
		JP 5336971	A	21-12-1993
		JP 8000073	B	10-01-1996
		US 5538871	A	23-07-1996
-----	-----	-----	-----	-----
WO 9504160	A 09-02-1995	AT 159767	T	15-11-1997
		AU 695349	B	13-08-1998
		AU 7269194	A	28-02-1995
		CA 2168010	A	09-02-1995
		CN 1131440	A	18-09-1996
		DE 69406544	D	04-12-1997
		DE 69406544	T	26-02-1998
		DK 711362	T	22-12-1997
		EP 0711362	A	15-05-1996
		EP 0778280	A	11-06-1997
		ES 2108479	T	16-12-1997
		FI 960403	A	29-01-1996
		HU 73802	A	30-09-1996
		JP 9501830	T	25-02-1997
		NO 960370	A	28-03-1996
		US 5770367	A	23-06-1998
-----	-----	-----	-----	-----
WO 9627681	A 12-09-1996	EP 0813609	A	29-12-1997
		JP 11500924	T	26-01-1999
-----	-----	-----	-----	-----
WO 9831830	A 23-07-1998	AU 5570098	A	07-08-1998
		WO 9932501	A	01-07-1999
-----	-----	-----	-----	-----